

## Схема догоняющей вакцинации и ревакцинаций против коклюша, дифтерии, столбняка

### с учетом использования зарегистрированных вакцин

В процессе вакцинации и RV1 ребенок находится в возрасте 3 месяца – 5 лет 11 мес 29 дней	Первичный курс: 3 введения (вакцинация) + 1 (ревакцинация) минимальный интервал между дозами					Ревакцинация в 6-7 лет
	введено	1я доза	1-2я доза	2-3я доза	3-RV1	RV1-RV2
	0/неизвестно	АаКДС\ АКДС	1 мес АаКДС\ АКДС	1 мес АаКДС\ АцКДС	12 (6 <sup>1</sup> ) мес АаКДС\ АКДС\ АакдС <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup> года (1 <sup>4</sup> год) АакдС\ АДС-М
	1					
	2					
	3					
<p>При нарушении сроков вакцинаций и ревакцинаций и проведении RV1 в возрасте 5-6 лет, RV2 может проводиться в соответствии с НКПП в возрасте 6-7 лет, RV3 - в 14 лет, далее ревакцинации каждые 10 лет.</p> <p>1. Интервал V3-RV1 может быть сокращен до 6 мес.</p> <p>2. Если ребенок 4 лет и старше получил 5 доз полиовакцины, для ревакцинации против дифтерии-столбняка-коклюша препаратом выбора может служить АакдС</p> <p>3. Интервал 2 года при использовании АакдС для ревакцинирующей дозы при вводе в календарь после АаКДС/АКДС/АакдС.</p> <p>4. Интервал 1 год при использовании АакдС для ревакцинирующей дозы при вводе в календарь после АДС-М.</p>						
6 лет и старше	Первичный курс : 2 + 1 (ревакцинация) минимальный интервал между дозами				RV2 догоняющая для ввода в календарь	RV3 с 14 лет
	введено	V1	V2	RV1	АакдС\ АДС-М	АакдС\ АДС-М
	0/неизвестно	АакдС <sup>5</sup> АДС-М	АакдС <sup>5</sup> АДС-М	АакдС	АакдС\ АДС-М	АакдС\ АДС-М
	1		1 мес	6-9 мес	2 <sup>3</sup> года (1 <sup>4</sup> год)	2 <sup>3</sup> года (1 <sup>4</sup> год)
	2					
	3					
<p>5. В условиях эпидемиологического неблагополучия по коклюшу и отсутствия других бК-вакцин по решению иммунологической комиссии допускается применение вакцины АакдС для первичной вакцинации (вне списка утвержденных показаний) и ревакцинации, которая вводится по схеме 2 + 1.</p>						